

BIOHUI®

博晖生物

核准日期: 2006年03月02日

修订日期: 2007年12月06日 2007年05月23日 2007年10月10日

人免疫球蛋白说明书

【警告】

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

【药品名称】

通用名称 人免疫球蛋白

【规格】

100mg/瓶 (10% 5ml)

【用法用量】

【成份】

由健康人血浆

用法: 肌肉注射, 不得用于静脉输注。

主要成份为人免疫球蛋白。本品系

本品为预防用

【预防麻疹】 为预防发病或减轻症状, 可在与麻疹患者

密切接触后, 于72小时内注射本品。

【预防乙型肝炎】 每瓶含乙型肝炎病毒(HBsAg) 1.5μg。

本品为预防用, 不得用于治疗。

【用法用量】 5-10ml, 6岁以上儿童至少7天注射一次。

【性状】

本品为白色或淡黄色澄明液体。

【不良反应】

【液体】 可能乳光, 不出现

【不良反应】

尚待积累和规范不良反应的监测资料。少数人会出现

应为本色或淡黄色澄明液体。

【不良反应】

过敏反应, 如荨麻疹、血管性水肿、过敏性休克等。

【注意事项】

【禁忌】

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细

2. 有IgA抗体的患者或IgA缺乏者

感染有一定的作用。

【注意事项】

毒理研究尚不清楚。

【贮藏】

于2~8℃避光保存和运输。

3. 运输及贮存过程中严禁冻结。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

【包装】

每瓶均用无菌玻璃瓶，于其防震。

合装。

本品

每瓶

本品

【用法用量】

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

《中国药典》2025年版三部和YBS00252013。

【参考文献】

【批准文号】

【药物相互作用】

国药准字S20063021 300mg/瓶

应单独使用。凡对免疫球蛋白有相互作用的药物可
能会对本品产生相互作用。

国药准字S20063020 150mg/瓶

【药品上市许可持有人】

【药物过量】

博晖生物制药(河北)有限公司

可能产生变异反应和因剂量大在注射部位造成疼
痛感。

【生产企业】

企业名称：博晖生物制药(河北)有限公司

吉山路6号

【药理毒理】

生产地址：石家庄高新区裕泰大街

是把免疫球蛋白内含有的大量抗体输给受者，使之

电话号码：0311-83935518

由

从低或无免疫状态很快达到暂时免疫保护状